

Informazioni:

N.O. Profilassi Malattie Infettive, Via Chiusaforte, 2 - UDINE
Tel. 0432 553211 - e-mail: malattie.infettive@ass4.sanita.fvg.it
www.ass4.sanita.fvg.it - web.uniud.it/zanzaratigre/ - www.comune.udine.it

5 regole per bloccare la zanzara tigre



La Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) è nera con bande bianche sulle zampe, sull'addome ed una singola striscia bianca sul dorso. Depone le uova in piccole raccolte d'acqua stagnante (secchi, sottovasi, bidoni, tombini, etc.). Punge insistentemente quasi sempre all'aperto e durante il giorno. Inoltre questa zanzara può essere un potenziale vettore di agenti patogeni per l'uomo e può contribuire alla diffusione della filariosi del cane.

La Zanzara Tigre può essere eliminata solo con un attento e costante controllo dei giardini privati, oltre che delle aree pubbliche.

Tutte le seguenti regole valgono anche per prevenire lo sviluppo delle altre specie comuni di zanzare.

1



Svuota almeno ogni cinque giorni sottovasi, ciotole per l'acqua degli animali, secchi, annaffiatoi, barattoli ecc.

2




Elimina pneumatici usati e contenitori inutili, come barattoli, lattine, ecc. affinché non accumulino acqua evitando la formazione di ristagni.

3



Possibilmente svuota completamente ogni 5 giorni oppure copri con zanzariere o con teli vasche, bidoni, serbatoi per l'irrigazione di giardini ed orti.

4



Tratta con insetticidi specifici, acquistabili presso le farmacie e "le agrarie", i tombini nei cortili ogni 7-14 giorni, secondo le istruzioni sulla confezione.

5



Metti pesci rossi o altri pesci che si nutrono di larve di zanzare nelle vasche ornamentali.

Informazions:

N.O. Profilassi Malatiis Infetivis, Vie Scluse (Via Chiusaforte) 2 - UDIN
Tel. 0432 553211 - pueste elettroniche: malattie.infettive@ass4.sanita.fvg.it
www.ass4.sanita.fvg.it - web.uniud.it/zanzaraticre/ - www.comune.udine.it

5 regulis par fermâ il moscjn tigre



Il Moscjn tigre (*Aedes albopictus*) al è neri cun strichis blancjis tes çatis, tal cuarp e une sole striche blancje te schene. Al fâs i ûfs in piçulis cuantitâts di aghe impoçade (seglots, sotvâs, bidons, pocits, e v.i.). Al beche tantis voltis, la plui part des voltis tal viert e vie pal di. Cun di plui chest Moscjn al podarès puartâ malatiis al om e al pues fâ che si slargji la filariosi dal cjan.

Il moscjn tigre si pues fermâ dome se si cjale dispès e cun atenzion i zardins privâts, in plui des areis publichis.

Dutis chestis regulis a son buinis ancje par prevignî altris speciis normâls di moscjins.

1



Strucje e disvuede almancul ogni 5 dîs sotvâs, scudielis di aghe pai animâi, seglots, sborfadôrs, gamelots e v.i..

2




Bute vie pneumatics vecjos lassâts ator e contignidôrs che no coventin, tant che bussulots, gamelots e v.i., par che no tegnin dentri aghe impoçade.

3




Se tu puedis, disvuede dal dut almancul ogni 5 dîs o cuvierç cun rêts paremoscjis o cun têi vascjis, bidons, contignidôrs par sborfâ e par bagnâ il zardin.

4



Bute inseticidis specifics, che si pues comprâ li des speziariis e des agrariis, tai pocits dai curtîi ogni 7-14 dîs, daûr des istruzions che a son te confezion.

5



Met cualchi pes ros o altris pes che a mangjin i cudui dai moscjins tes vascjis e tes fontanis di bielece.