

Unità Conoscitiva n. 1

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Fustaia	Fascia vegetazionale	QTA																				
Tipo forestale	Lecceta																						
Superficie totale (ha)	1,32	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quercus ilex</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Carpinus betulus</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Robinia pseudoacacia</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Quercus ilex	90	Carpinus betulus	5	Robinia pseudoacacia	5												
Specie	Presenza % della specie																						
Quercus ilex	90																						
Carpinus betulus	5																						
Robinia pseudoacacia	5																						
Superficie non boscata	0,00																						
Superficie improduttiva	0,00																						
Superficie boscata	1,32																						
Quota media (m. s.l.m.)	105																						
Quota massima	127																						
Quota minima	90																						
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	< 10°	Esposizione	O																		
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																				
Dati dendrometrici della fustaia (massa e inc.to corrente espressi in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa di riferimento</td> <td>300,0</td> <td>Coefficiente di adeguamento</td> <td>100</td> <td>Inc.to percentuale</td> <td>0,2%</td> </tr> <tr> <td>Massa/ha fustaia</td> <td>300,0</td> <td>Inc.to corrente/ha</td> <td>0,6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Massa totale fustaia</td> <td>396</td> <td>Inc.to corrente totale</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Massa di riferimento	300,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	0,2%	Massa/ha fustaia	300,0	Inc.to corrente/ha	0,6			Massa totale fustaia	396	Inc.to corrente totale	1		
Massa di riferimento	300,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	0,2%																		
Massa/ha fustaia	300,0	Inc.to corrente/ha	0,6																				
Massa totale fustaia	396	Inc.to corrente totale	1																				
Descrizione particellare: Formazione di chiara origine antropica costituita prevalentemente da leccio governato a fustaia. Popolamento denso con piante mature. Le condizioni fitopatologiche sono buone a parte alcuni sintomi manifesti di senescenza. Rinnovazione assente. Accessibilità molto buona.																							

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 3 mappali (4,830491 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
 - taglio per piede d'albero al fine di eliminare le piante deperienti e favorire la rinnovazione esistente

Super Categoria Normativa:

3 mappali (4,830491 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

Unità Conoscitiva n. 2

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA																										
Tipo forestale	Robinetto misto																												
Superficie totale (ha)	2,40	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Robinia pseudoacacia</td><td>28</td></tr> <tr><td>Quercus petraea</td><td>20</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>13</td></tr> <tr><td>Quercus pubescens</td><td>8</td></tr> <tr><td>Ulmus campestris</td><td>8</td></tr> <tr><td>Acer campestre</td><td>6</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ailantus altissima</td><td>4</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>2</td></tr> <tr><td>Carpinus betulus</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Robinia pseudoacacia	28	Quercus petraea	20	Ostrya carpinifolia	13	Quercus pubescens	8	Ulmus campestris	8	Acer campestre	6	Altre specie arboree	5	Ailantus altissima	4	Altri arbusti	2	Corylus avellana	2	Carpinus betulus	2	Fraxinus ornus	2
Specie	Presenza % della specie																												
Robinia pseudoacacia	28																												
Quercus petraea	20																												
Ostrya carpinifolia	13																												
Quercus pubescens	8																												
Ulmus campestris	8																												
Acer campestre	6																												
Altre specie arboree	5																												
Ailantus altissima	4																												
Altri arbusti	2																												
Corylus avellana	2																												
Carpinus betulus	2																												
Fraxinus ornus	2																												
Superficie non boscata	0,00																												
Superficie improduttiva	0,00																												
Superficie boscata	2,40																												
Quota media (m. s.l.m.)	90																												
Quota massima	106																												
Quota minima	70																												
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	S																								
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																											
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																										
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa/ha forma promiscua</td> <td>185,0</td> <td>Massa totale forma promiscua</td> <td>444</td> </tr> </table>					Massa/ha forma promiscua	185,0	Massa totale forma promiscua	444																					
Massa/ha forma promiscua	185,0	Massa totale forma promiscua	444																										

Descrizione particellare:

Formazione posta sui primi rilievi collinari in prossimità della frazione di Villa di Villa. Trattasi del versante sud di un arco collinare di limitata estensione e caratterizzato dalla presenza di bei esemplari di querce in posizione sommitale. Nelle parti basali, invece, troviamo un insieme di specie in parte portate dall'antropizzazione, in primis la robinia, in parte rispecchianti la vera attitudine stazionale. È probabile, infatti, che la localizzazione fosse particolarmente in sintonia con il querco-carpinetto collinare ora in fase di degrado. L'accessibilità è buona.

Indicazioni per Unità Conoscitiva:

-

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

20 mappali (7,23069 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Robinieti misti non governati a ceduo (forme promiscue) - attribuita a 20 mappali per una superficie (7,23069 ha)

- al taglio rilascio di 200 piante/ha nate da seme (1 ogni 7 metri), di specie diverse dalla robinia. Tale numero può essere raggiunto anche con rilascio di polloni appartenenti a specie diverse dalla robinia o se non ancora sufficienti con piante di robinia da rilasciare per invecchiamento fino al disseccamento della chioma.

Unità Conoscitiva n. 3

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Fustaia	Fascia vegetazionale	QTA										
Tipo forestale	Rimboschimento												
Superficie totale (ha)	1,85	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ostrya carpinifolia</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Acer pseudoplatanus</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Fraxinus excelsior</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Robinia pseudoacacia</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Ostrya carpinifolia	80	Acer pseudoplatanus	10	Fraxinus excelsior	8	Robinia pseudoacacia	2
Specie	Presenza % della specie												
Ostrya carpinifolia	80												
Acer pseudoplatanus	10												
Fraxinus excelsior	8												
Robinia pseudoacacia	2												
Superficie non boscata	0,00												
Superficie improduttiva	0,00												
Superficie boscata	1,85												
Quota media (m. s.l.m.)	115												
Quota massima	139												
Quota minima	90												
Assolazione (hn)	1000 - 1400	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	S-E								
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi													
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%										

Dati dendrometrici della fustaia (massa e inc.to corrente espressi in mc)

Massa di riferimento	65,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	2, %
Massa/ha fustaia	65,0			Inc.to corrente/ha	1,3
Massa totale fustaia	120			Inc.to corrente totale	2

Descrizione particellare:

Rimboschimenti di latifoglie generalmente allo stadio evolutivo di novelleto/forteto in localizzazioni sparse su tutto il territorio comunale. Essi sono variabili per estensione e tipologia di specie utilizzate mentre la composizione è quasi sempre monospecifica. Le specie più in uso sono il carpino nero, il frassino maggiore e l'acero. La rispondenza della specie alla stazione è quasi sempre adeguata. La viabilità è quasi sempre buona. Possiamo dire che nell'ambito comunale il rimboschimento di aree anche di limitata estensione, prevalentemente con l'uso di selvaggioni, è pratica consolidata e solitamente attuata su ex prati/pascoli.

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

16 mappali (4,1696 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Interventi su fustaia con mappali di limitata estensione - attribuita a 16 mappali per una superficie (4,1696 ha)

- taglio di una pianta ogni due o taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie inferiore a 500 mq, non contigue e distanziate a tra loro di almeno 50 metri. La stessa area potrà essere interessata dal taglio dopo 10 anni.

Unità Conoscitiva n. 4

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Ceduo	Fascia vegetazionale	QTA																									
Tipo forestale	Robinetto misto																											
Superficie totale (ha)	8,10	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Robinia pseudoacacia</td><td>72</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>9</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>6</td></tr> <tr><td>Acer campestre</td><td>4</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>2</td></tr> <tr><td>Quercus pubescens</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Robinia pseudoacacia	72	Ostrya carpinifolia	9	Fraxinus ornus	6	Acer campestre	4	Altre specie arboree	3	Altri arbusti	2	Corylus avellana	2	Quercus pubescens	2							
Specie	Presenza % della specie																											
Robinia pseudoacacia	72																											
Ostrya carpinifolia	9																											
Fraxinus ornus	6																											
Acer campestre	4																											
Altre specie arboree	3																											
Altri arbusti	2																											
Corylus avellana	2																											
Quercus pubescens	2																											
Superficie non boscata	0,00																											
Superficie improduttiva	0,00																											
Superficie boscata	8,10																											
Quota media (m. s.l.m.)	360																											
Quota massima	585																											
Quota minima	85																											
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	S																							
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																										
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																									
Dati dendrometrici del ceduo (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa di riferimento</td> <td>190,0</td> <td>Coefficiente di adeguamento</td> <td>100</td> <td>Turno</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Massa/ha ceduo</td> <td>190,0</td> <td colspan="3"> Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>25</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>25</td> <td>Stramature</td> <td>25</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Massa totale ceduo</td> <td>1.539</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Massa di riferimento	190,0	Coefficiente di adeguamento	100	Turno	15	Massa/ha ceduo	190,0	Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>25</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>25</td> <td>Stramature</td> <td>25</td> </tr> </table>			Giovani	25	Medie	25	Mature	25	Stramature	25	Massa totale ceduo	1.539			
Massa di riferimento	190,0	Coefficiente di adeguamento	100	Turno	15																							
Massa/ha ceduo	190,0	Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>25</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>25</td> <td>Stramature</td> <td>25</td> </tr> </table>			Giovani	25	Medie	25	Mature	25	Stramature	25																
Giovani	25	Medie	25	Mature	25	Stramature	25																					
Massa totale ceduo	1.539																											
Descrizione particellare: Formazione che si trova nei versanti esposti a sud dove insieme alla robinia si insediano il carpino nero, l'orniello, la roverella, l'acero campestre. Dove le piante sono state ceduate si ha l'espansione incontrastata della robinia, dove invece questa è lasciata invecchiare si osserva la rinnovazione di carpino nero, acero ed orniello. Sempre presente nello strato arbustivo il nocciolo. Copertura regolare colma. Accessibilità buona.																												

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 121 mappali (60,88888 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
 - si consiglia l'invecchiamento della robinia allo scopo di ridurre la facoltà pollonifera.

Super Categoria Normativa:

121 mappali (60,88888 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - E

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Orno-ostrieti con robinia governati a ceduo - attribuita a 121 mappali per una superficie (60,88888 ha)

- se trascorsi 15 anni dall'ultimo taglio, obbligo rilascio di 150 matricine/ha (1 ogni 8 metri), diverse dalla robinia.

Unità Conoscitiva n. 5

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA
Tipo forestale	Robiniato misto		
Superficie totale (ha)	6,78	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO	
Superficie non boscata	0,00	Specie	Presenza % della specie
Superficie improduttiva	0,00	Robinia pseudoacacia	79
Superficie boscata	6,78	Acer pseudoplatanus	3
Quota media (m. s.l.m.)	210	Populus alba	3
Quota massima	260	Ulmus campestris	3
Quota minima	120	Acer campestre	2
		Platanus spp.	2
		Prunus avium	2
		Altre specie arboree	2
		Altri arbusti	1
		Corylus avellana	1
		Cornus sanguinea	1
		Sambucus nigra	1
Assolazione (hn)	1000 - 1400	Inclinazione (gradi)	20° - 10°
		Esposizione	S-O
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03	Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi		
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc)			
Massa/ha forma promiscua	210,0	Massa totale forma promiscua	1.424
Descrizione particellare:			
Formazione localizzata negli impluvi freschi, alla base dei quali si hanno dei piccoli corsi d'acqua dove si insediano l'olmo, l'acero campestre e montano, il pioppo. La robinia è prevalente a causa della marcata antropizzazione. A livello arbustivo si trovano la sanguinella, il sambuco e il nocciolo. Qualche singola pianta sparsa di platano, dove c'è acqua, e ciliegio. Copertura regolare colma. Accessibilità buona.			

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 101 mappali (16,51056 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
- si consiglia l'invecchiamento della robinia allo scopo di ridurre la facoltà pollonifera.

Super Categoria Normativa:

101 mappali (16,51056 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Robinieti misti non governati a ceduo (forme promiscue) - attribuita a 101 mappali per una superficie (16,51056 ha)

- al taglio rilascio di 200 piante/ha nate da seme (1 ogni 7 metri), di specie diverse dalla robinia. Tale numero può essere raggiunto anche con rilascio di polloni appartenenti a specie diverse dalla robinia o se non ancora sufficienti con piante di robinia da rilasciare per invecchiamento fino al disseccamento della chioma.

Unità Conoscitiva n. 6

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA
Tipo forestale	Castagneto dei suoli mesici		
Superficie totale (ha)	7,19	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO	
Superficie non boscata	0,00	Specie	Presenza % della specie
Superficie improduttiva	0,00	Castanea sativa	80
Superficie boscata	7,19	Ostrya carpinifolia	6
Quota media (m. s.l.m.)	510	Fraxinus ornus	4
Quota massima	605	Prunus avium	3
Quota minima	310	Altre specie arboree	3
		Altri arbusti	2
		Corylus avellana	2
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°
		Esposizione	S-E
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03	Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi		
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc)			
Massa/ha forma promiscua	220,0	Massa totale forma promiscua	1.582

Descrizione particellare:

Popolamento sviluppato su suoli mediamente profondi con discreta disponibilità di nutrienti ed esposizione sud. Il piano dominante è occupato dal castagno in associazione con sporadiche piante di ciliegio selvatico. Sul piano dominato troviamo elementi arborei provenienti dalle formazioni di orno ostrieto conermini. I boschi sono solitamente maturi, con copertura regolare-colma. La fertilità della stazione è dimostrata dalla statura delle piante presenti nel piano dominante. Tra queste il castagno, presente sia come ceduo invecchiato che come pianta di origine gamica, si trova in condizioni fitosanitarie precarie con chiome spesso disseccate e ricaccio di polloni dalla base o dal tronco. La rinnovazione, scarsa sotto copertura, appare buona nelle zone liberate. La viabilità è buona.

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 58 mappali (90,79667 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- sulle eventuali piante di castagno da frutto, da conteggiare come matricine, sono consentiti interventi di potatura fitosanitaria e di ringiovanimento della chioma. E' consentito il taglio dei soggetti arborei situati entro una distanza pari a una volta e mezza l'altezza delle piante di castagno da frutto.

Super Categoria Normativa:

58 mappali (90,79667 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie) - attribuita a 58 mappali per una superficie (90,79667 ha)

- numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio minore di 50, rilasciare almeno metà dei soggetti vivi scelti fra i migliori; numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 50, taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie non superiore a 2000 mq e distanziate fra loro di almeno 50 m o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presenti

Unità Conoscitiva n. 7

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA																						
Tipo forestale	Rimboscimento																								
Superficie totale (ha)	0,64	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Picea abies</td><td>38</td></tr> <tr><td>Fagus silvatica</td><td>18</td></tr> <tr><td>Larix decidua</td><td>12</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>7</td></tr> <tr><td>Pinus sylvestris</td><td>5</td></tr> <tr><td>Acer pseudoplatanus</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Picea abies	38	Fagus silvatica	18	Larix decidua	12	Ostrya carpinifolia	10	Fraxinus ornus	7	Pinus sylvestris	5	Acer pseudoplatanus	3	Altre specie arboree	3	Altri arbusti	2	Corylus avellana	2
Specie	Presenza % della specie																								
Picea abies	38																								
Fagus silvatica	18																								
Larix decidua	12																								
Ostrya carpinifolia	10																								
Fraxinus ornus	7																								
Pinus sylvestris	5																								
Acer pseudoplatanus	3																								
Altre specie arboree	3																								
Altri arbusti	2																								
Corylus avellana	2																								
Superficie non boscata	0,00																								
Superficie improduttiva	0,00																								
Superficie boscata	0,64																								
Quota media (m. s.l.m.)	545																								
Quota massima	560																								
Quota minima	535																								
Assolazione (hn)	1000 - 1400	Inclinazione (gradi)	< 10°	Esposizione	O																				
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																						
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa/ha forma promiscua</td> <td>260,0</td> <td>Massa totale forma promiscua</td> <td>166</td> </tr> </table>					Massa/ha forma promiscua	260,0	Massa totale forma promiscua	166																	
Massa/ha forma promiscua	260,0	Massa totale forma promiscua	166																						

Descrizione particellare:

Rimboscimento misto di conifere varie e faggio allo stadio evolutivo di perticaia o adulto posto sul piano dominante su orno ostrieto con piante gestite a ceduo localmente ben sviluppate. Terreni profondi. Presenza di rinnovazione nelle chiarie. Copertura regolare colma. Viabilità presente.

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva:

13 mappali (4,1062 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- graduale eliminazione delle conifere.

Super Categoria Normativa:

13 mappali (4,1062 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Interventi su fustaia con mappali di limitata estensione - attribuita a 13 mappali per una superficie (4,1062 ha)

- taglio di una pianta ogni due o taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie inferiore a 500 mq, non contigue e distanziate a tra loro di almeno 50 metri. La stessa area potrà essere interessata dal taglio dopo 10 anni.

Unità Conoscitiva n. 8

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Fustaia	Fascia vegetazionale	FA																				
Tipo forestale	Formazioni antropogene di conifere																						
Superficie totale (ha)	14,29	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Picea abies</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Picea abies	100																
Specie	Presenza % della specie																						
Picea abies	100																						
Superficie non boscata	0,00																						
Superficie improduttiva	0,00																						
Superficie boscata	14,29																						
Quota media (m. s.l.m.)	780																						
Quota massima	850																						
Quota minima	690																						
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	E																		
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																				
Dati dendrometrici della fustaia (massa e inc.to corrente espressi in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa di riferimento</td> <td>300,0</td> <td>Coefficiente di adeguamento</td> <td>100</td> <td>Inc.to percentuale</td> <td>2, %</td> </tr> <tr> <td>Massa/ha fustaia</td> <td>300,0</td> <td colspan="2"></td> <td>Inc.to corrente/ha</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Massa totale fustaia</td> <td>4.286</td> <td colspan="2"></td> <td>Inc.to corrente totale</td> <td>86</td> </tr> </table>						Massa di riferimento	300,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	2, %	Massa/ha fustaia	300,0			Inc.to corrente/ha	6,0	Massa totale fustaia	4.286			Inc.to corrente totale	86
Massa di riferimento	300,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	2, %																		
Massa/ha fustaia	300,0			Inc.to corrente/ha	6,0																		
Massa totale fustaia	4.286			Inc.to corrente totale	86																		
Descrizione particellare: Rimboschimento di abete rosso in area montana su ex prati-pascoli con pendenze non molto accentuate. Fustaia coetanea allo stadio evolutivo di perticaia con densità elevata e con necessità di essere diradati. Suoli moderatamente profondi a tessitura media e drenaggio buono. Sono ben serviti dalla viabilità.																							

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

48 mappali (54,68955 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Interventi su fustaia con mappali di limitata estensione - attribuita a 48 mappali per una superficie (54,68955 ha)

- taglio di una pianta ogni due o taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie inferiore a 500 mq, non contigue e distanziate a tra loro di almeno 50 metri. La stessa area potrà essere interessata dal taglio dopo 10 anni.

Unità Conoscitiva n. 9

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA - FA																						
Tipo forestale	Rimboscimento																								
Superficie totale (ha)	1,52	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Picea abies</td><td>30</td></tr> <tr><td>Larix decidua</td><td>27</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>15</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>10</td></tr> <tr><td>Pinus sylvestris</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fagus silvatica</td><td>3</td></tr> <tr><td>Prunus avium</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Picea abies	30	Larix decidua	27	Ostrya carpinifolia	15	Fraxinus ornus	10	Pinus sylvestris	5	Fagus silvatica	3	Prunus avium	3	Altre specie arboree	3	Altri arbusti	2	Corylus avellana	2
Specie	Presenza % della specie																								
Picea abies	30																								
Larix decidua	27																								
Ostrya carpinifolia	15																								
Fraxinus ornus	10																								
Pinus sylvestris	5																								
Fagus silvatica	3																								
Prunus avium	3																								
Altre specie arboree	3																								
Altri arbusti	2																								
Corylus avellana	2																								
Superficie non boscata	0,00																								
Superficie improduttiva	0,00																								
Superficie boscata	1,52																								
Quota media (m. s.l.m.)	525																								
Quota massima	550																								
Quota minima	510																								
Assolazione (hn)	1000 - 1400	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	N-E																				
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																						
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa/ha forma promiscua</td> <td>270,0</td> <td>Massa totale forma promiscua</td> <td>411</td> </tr> </table>					Massa/ha forma promiscua	270,0	Massa totale forma promiscua	411																	
Massa/ha forma promiscua	270,0	Massa totale forma promiscua	411																						
Descrizione particellare: Coniferamento di conifere varie allo stadio evolutivo di perticaia-adulto posto sul piano dominante su orno-ostrieto con piante localmente ben sviluppate e buona rinnovazione. Terreni mediamente profondi. Accessibilità buona.																									

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 10 mappali (4,2145 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
 - graduale eliminazione delle conifere. Taglio e rilascio di una pianta ogni 10 m.

Super Categoria Normativa:

10 mappali (4,2145 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

Unità Conoscitiva n. 10

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Fustaia	Fascia vegetazionale	FA										
Tipo forestale	Faggeta montana tipica esalpica												
Superficie totale (ha)	4,08	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fagus silvatica</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Conifere diverse</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Altre specie arboree</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Altri arbusti</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Fagus silvatica	90	Conifere diverse	5	Altre specie arboree	3	Altri arbusti	2
Specie	Presenza % della specie												
Fagus silvatica	90												
Conifere diverse	5												
Altre specie arboree	3												
Altri arbusti	2												
Superficie non boscata	0,00												
Superficie improduttiva	0,00												
Superficie boscata	4,08												
Quota media (m. s.l.m.)	810												
Quota massima	866												
Quota minima	740												
Assolazione (hn)	1000 - 1400	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	N-E								
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi													
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%										

Dati dendrometrici della fustaia (massa e inc.to corrente espressi in mc)

Massa di riferimento	280,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	1,5%
Massa/ha fustaia	280,0			Inc.to corrente/ha	4,2
Massa totale fustaia	1.141			Inc.to corrente totale	17

Descrizione particellare:

Unità conoscitiva ascrivibile alle faggete montane tipiche esalpiche per la presenza di condizioni stazionali di freschezza e conformazione del soprassuolo presente. Domina, infatti, il faggio sia in forma di ceduo invecchiato o di fustaia con sporadiche presenze di elementi dell'orno-ostrieto localizzati in zone di espluvio o su versanti rocciosi. I suoli sono profondi anche se caratterizzati da sparsi affioramenti rocciosi con buon accumulo di sostanza organica in superficie. Popolamenti tendenzialmente monoplani con rinnovazione sporadica. Viabilità presente.

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

14 mappali (69,03362 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie) - attribuita a 14 mappali per una superficie (69,03362 ha)

- numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio minore di 50, rilasciare almeno metà dei soggetti vivi scelti fra i migliori; numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 50, taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie non superiore a 2000 mq e distanziate fra loro di almeno 50 m o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presenti

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA																								
Tipo forestale	Castagneto dei suoli xerici																										
Superficie totale (ha)	3,68	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Castanea sativa</td><td>42</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>12</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>8</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>3</td></tr> <tr><td>Acer campestre</td><td>2</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cornus mas</td><td>2</td></tr> <tr><td>Quercus pubescens</td><td>2</td></tr> <tr><td>Quercus petraea</td><td>1</td></tr> <tr><td>Viburnum lantana</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Castanea sativa	42	Ostrya carpinifolia	25	Fraxinus ornus	12	Corylus avellana	8	Altre specie arboree	3	Acer campestre	2	Altri arbusti	2	Cornus mas	2	Quercus pubescens	2	Quercus petraea	1	Viburnum lantana	1
Specie	Presenza % della specie																										
Castanea sativa	42																										
Ostrya carpinifolia	25																										
Fraxinus ornus	12																										
Corylus avellana	8																										
Altre specie arboree	3																										
Acer campestre	2																										
Altri arbusti	2																										
Cornus mas	2																										
Quercus pubescens	2																										
Quercus petraea	1																										
Viburnum lantana	1																										
Superficie non boscata	0,00																										
Superficie improduttiva	0,00																										
Superficie boscata	3,68																										
Quota media (m. s.l.m.)	280																										
Quota massima	410																										
Quota minima	255																										
Assolazione (hn)		Inclinazione (gradi)	30° - 20°	Esposizione	S-E																						
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																									
Patologia riscontrata	nessuna		% Sup. interessata	0%																							
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa/ha forma promiscua</td> <td>120,0</td> <td>Massa totale forma promiscua</td> <td>441</td> </tr> </table>					Massa/ha forma promiscua	120,0	Massa totale forma promiscua	441																			
Massa/ha forma promiscua	120,0	Massa totale forma promiscua	441																								
Descrizione particellare: Unità isolate ricomprese all'interno di ampie formazioni con carpino nero prevalente. In queste porzioni localizzate si è affermato il castagno in condizioni stazionali più favorevoli in particolare dal punto di vista edafico. Il castagno si trova sul piano dominante ma è in condizione fitosanitaria precaria. Il piano dominato è costituito da specie appartenenti all'orno-ostrieto e corileto. La viabilità è prossima.																											

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 41 mappali (26,3575 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- sulle eventuali piante di castagno da frutto, da conteggiare come matricine, sono consentiti interventi di potatura fitosanitaria e di ringiovanimento della chioma. E' consentito il taglio dei soggetti arborei situati entro una distanza pari a una volta e mezza l'altezza delle piante di castagno da frutto.

Super Categoria Normativa:

41 mappali (26,3575 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Orno-ostrieti, ostrio-querceti, querceti dei substrati magmatici e variante dei suoli xerici del rovereto governati a ceduo - attribuita a 41 mappali per una superficie (26,3575 ha)

- numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m) compresi tutti quelli con diametro a 1,3 m da terra maggiore di 35 cm fino all'età di 4 volte il turno minimo, possibilmente appartenenti alle seguenti specie: aceri, faggio, cerro, leccio, farnia e altre querce, sorbi ciliegi, alberi di giuda, cipressi

Unità Conoscitiva n. 12

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Fustaia	Fascia vegetazionale	QTA										
Tipo forestale	Rimboscimento												
Superficie totale (ha)	1,08	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ostrya carpinifolia</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Acer pseudoplatanus</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Fraxinus excelsior</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Fagus silvatica</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Ostrya carpinifolia	35	Acer pseudoplatanus	25	Fraxinus excelsior	25	Fagus silvatica	15
Specie	Presenza % della specie												
Ostrya carpinifolia	35												
Acer pseudoplatanus	25												
Fraxinus excelsior	25												
Fagus silvatica	15												
Superficie non boscata	0,00												
Superficie improduttiva	0,00												
Superficie boscata	1,08												
Quota media (m. s.l.m.)	380												
Quota massima	520												
Quota minima	340												
Assolazione (hn)	800 - 1000	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	O								
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi													
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%										

Dati dendrometrici della fustaia (massa e inc.to corrente espressi in mc)

Massa di riferimento	115,0	Coefficiente di adeguamento	100	Inc.to percentuale	2, %
Massa/ha fustaia	115,0			Inc.to corrente/ha	2,3
Massa totale fustaia	124			Inc.to corrente totale	2

Descrizione particellare:

Rimboschimenti di latifoglie generalmente allo stadio evolutivo di novelleto/forteto in localizzazioni sparse su tutto il territorio comunale. Essi sono variabili per estensione e tipologia di specie utilizzate mentre la composizione è quasi sempre monospecifica. Le specie più in uso sono il carpino nero, il faggio, il frassino maggiore e l'acero. La rispondenza della specie alla stazione è quasi sempre adeguata. La viabilità è quasi sempre buona. Possiamo dire che nell'ambito comunale il rimboscimento di aree anche di limitata estensione, prevalentemente con l'uso di selvaggioni, è pratica consolidata e solitamente attuata su ex prati/pascoli.

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

19 mappali (4,70918 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Interventi su fustaia con mappali di limitata estensione - attribuita a 19 mappali per una superficie (4,70918 ha)

- taglio di una pianta ogni due o taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie inferiore a 500 mq, non contigue e distanziate a tra loro di almeno 50 metri. La stessa area potrà essere interessata dal taglio dopo 10 anni.

Unità Conoscitiva n. 13

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Ceduo	Fascia vegetazionale	QTA
Tipo forestale	Orno-ostrieto primitivo di rupe		
Superficie totale (ha)	5,12	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO	
Superficie non boscata	0,00	Specie	Presenza % della specie
Superficie improduttiva	0,00	Ostrya carpinifolia	40
Superficie boscata	5,12	Fraxinus ornus	27
Quota media (m. s.l.m.)	290	Quercus pubescens	20
Quota massima	355	Prunus avium	3
Quota minima	240	Altre specie arboree	3
		Altri arbusti	2
		Corylus avellana	2
		Cornus mas	2
		Sorbus aria	1
Assolazione (hn)	1000 - 1400	Inclinazione (gradi)	50° - 30°
		Esposizione	O
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03	Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi		
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%
Dati dendrometrici del ceduo (massa espressa in mc)			
Massa di riferimento	120,0	Coefficiente di adeguamento	100
Massa/ha ceduo	120,0	Turno	20
Massa totale ceduo	615	Ripartizione cronologica % dei polloni	
		Giovani	15
		Medie	20
		Mature	35
		Stramature	30

Descrizione particellare:

Formazione ascrivibile all'orno-ostrieto primitivo di rupe formata da un ceduo tipicamente di carpino nero ed orniello. In associazione è presente anche la roverella. Si sottolinea anche la presenza di sporadici ciliegi e di vari arbusti. I suoli, su versanti molto pendenti e rocciosi, sono superficiali, talvolta anche pietrosi con accumulo di sostanza organica localizzato. La forma di governo è ascrivibile ai cedui tendenzialmente invecchiati, infatti si caratterizzano per la presenza di ceppaie poco numerose a distribuzione aggregata con un cospicuo numero di polloni. La rinnovazione gamica deve essere assolutamente favorita. Verso la parte a monte, dove le pendenze si attenuano il popolamento è assimilabile all'orno-ostrieto tipico. Copertura lacunosa. Accessibilità difficile.

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

26 mappali (15,18748 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - E

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Formazioni di latifoglie governate a ceduo con funzioni di protezione - attribuita a 26 mappali per una superficie (15,18748 ha)

- numero anni intercorsi dall'ultimo taglio 20, obbligo di rilascio di almeno 150 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 8 m).

Unità Conoscitiva n. 14

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Neoformazione	Fascia vegetazionale	QTA																				
Tipo forestale	Corileto																						
Superficie totale (ha)	0,85	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Corylus avellana</td><td>30</td></tr> <tr><td>Acer campestre</td><td>18</td></tr> <tr><td>Acer pseudoplatanus</td><td>15</td></tr> <tr><td>Populus alba</td><td>11</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>9</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>7</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>5</td></tr> <tr><td>Prunus avium</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Corylus avellana	30	Acer campestre	18	Acer pseudoplatanus	15	Populus alba	11	Fraxinus ornus	9	Ostrya carpinifolia	7	Altre specie arboree	5	Prunus avium	3	Altri arbusti	2
Specie	Presenza % della specie																						
Corylus avellana	30																						
Acer campestre	18																						
Acer pseudoplatanus	15																						
Populus alba	11																						
Fraxinus ornus	9																						
Ostrya carpinifolia	7																						
Altre specie arboree	5																						
Prunus avium	3																						
Altri arbusti	2																						
Superficie non boscata	0,00																						
Superficie improduttiva	0,00																						
Superficie boscata	0,85																						
Quota media (m. s.l.m.)	455																						
Quota massima	480																						
Quota minima	435																						
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°																				
		Esposizione	S-E																				
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																				
Dati dendrometrici relativi alla neoformazione <table border="1"> <tr> <td>Tipo forestale potenziale</td> <td>Orno-ostrieto tipico</td> </tr> <tr> <td>Anni per ingresso in gestione</td> <td>15</td> </tr> </table>				Tipo forestale potenziale	Orno-ostrieto tipico	Anni per ingresso in gestione	15																
Tipo forestale potenziale	Orno-ostrieto tipico																						
Anni per ingresso in gestione	15																						
Descrizione particellare: Formazione di ricolonizzazione di una zona di impluvio dove la freschezza stagionale è dimostrata dalla presenza di specie arboree quali pioppo, acero montano e campestre. Il nocciolo, presente con densità elevate, si accompagna anche al carpino nero ed altre specie sporadiche. Probabilmente popolamenti di transizione verso tipologie più stabili. Suoli superficiali localizzati alle aree di impluvio, talvolta pietrosi. Le zone al margine degli sono generalmente caratterizzate da suoli più profondi Copertura regolare colma. Accessibilità buona.																							

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 12 mappali (8,999048 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
 - lasciare il bosco alla libera evoluzione, prevedendo interventi di pulizia a carico del nocciolo con rilascio di tutte le altre specie presenti.

Super Categoria Normativa:

12 mappali (8,999048 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - C

Prescrizioni speciali:

Unità Conoscitiva n. 15

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA - FA																						
Tipo forestale	Castagneto dei suoli xerici																								
Superficie totale (ha)	1,86	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Castanea sativa</td><td>46</td></tr> <tr><td>Conifere diverse</td><td>15</td></tr> <tr><td>Quercus petraea</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>8</td></tr> <tr><td>Acer pseudoplatanus</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>4</td></tr> <tr><td>Prunus avium</td><td>4</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Castanea sativa	46	Conifere diverse	15	Quercus petraea	10	Fraxinus ornus	8	Acer pseudoplatanus	5	Ostrya carpinifolia	4	Prunus avium	4	Corylus avellana	3	Altre specie arboree	3	Altri arbusti	2
Specie	Presenza % della specie																								
Castanea sativa	46																								
Conifere diverse	15																								
Quercus petraea	10																								
Fraxinus ornus	8																								
Acer pseudoplatanus	5																								
Ostrya carpinifolia	4																								
Prunus avium	4																								
Corylus avellana	3																								
Altre specie arboree	3																								
Altri arbusti	2																								
Superficie non boscata	0,00																								
Superficie improduttiva	0,00																								
Superficie boscata	1,86																								
Quota media (m. s.l.m.)	570																								
Quota massima	605																								
Quota minima	525																								
Assolazione (hn)	800 - 1000	Inclinazione (gradi)	30° - 20°																						
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																						
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa/ha forma promiscua</td> <td>250,0</td> <td>Massa totale forma promiscua</td> <td>465</td> </tr> </table>				Massa/ha forma promiscua	250,0	Massa totale forma promiscua	465																		
Massa/ha forma promiscua	250,0	Massa totale forma promiscua	465																						

Descrizione particellare:

Unità isolata ricomprese all'interno di ampie formazioni con carpino nero prevalente. In questa porzione localizzata su versante esposto a N-O di un impluvio, in condizioni stazionali di maggior freschezza, si è affermato il castagno. Esso si trova sul piano dominante, in associazione con rovere, ciliegio e sporadiche conifere. Lo stadio evolutivo è ascrivibile all'adulto. Il piano dominato è costituito da arbusti e da esemplari di acero montano ed orniello. Il castagno si trova in un precario stato fitosanitario evidenziato da fenomeni di disseccamento di alcune branche. I suoli si presentano superficiali, a tratti pietrosi. Si osserva inoltre una certa quantità di materiale organico indecomposto. Copertura regolare colma. Accessibilità scarsa

Indicazioni per Unità Conoscitiva:

- graduale eliminazione delle conifere

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva:

7 mappali (17,22539 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- sulle eventuali piante di castagno da frutto, da conteggiare come matricine, sono consentiti interventi di potatura fitosanitaria e di ringiovanimento della chioma. E' consentito il taglio dei soggetti arborei situati entro una distanza pari a una volta e mezza l'altezza delle piante di castagno da frutto.

Super Categoria Normativa:

7 mappali (17,22539 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

- prescrizione relativa a - Interventi su fustaia con mappali di limitata estensione - attribuita a 7 mappali per una superficie (17,22539 ha)
- taglio di una pianta ogni due o taglio a buche di forma circolare o rettangolare di superficie inferiore a 500 mq, non contigue e distanziate a tra loro di almeno 50 metri. La stessa area potrà essere interessata dal taglio dopo 10 anni.

Unità Conoscitiva n. 16

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Ceduo	Fascia vegetazionale	QTA																									
Tipo forestale	Orno-ostrieto tipico																											
Superficie totale (ha)	28,44	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>45</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>20</td></tr> <tr><td>Quercus pubescens</td><td>15</td></tr> <tr><td>Quercus petraea</td><td>5</td></tr> <tr><td>Castanea sativa</td><td>4</td></tr> <tr><td>Prunus avium</td><td>3</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>2</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>2</td></tr> <tr><td>Sorbo spp.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Viburnum lantana</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Ostrya carpinifolia	45	Fraxinus ornus	20	Quercus pubescens	15	Quercus petraea	5	Castanea sativa	4	Prunus avium	3	Altri arbusti	2	Corylus avellana	2	Altre specie arboree	2	Sorbo spp.	1	Viburnum lantana	1	
Specie	Presenza % della specie																											
Ostrya carpinifolia	45																											
Fraxinus ornus	20																											
Quercus pubescens	15																											
Quercus petraea	5																											
Castanea sativa	4																											
Prunus avium	3																											
Altri arbusti	2																											
Corylus avellana	2																											
Altre specie arboree	2																											
Sorbo spp.	1																											
Viburnum lantana	1																											
Superficie non boscata	0,00																											
Superficie improduttiva	0,00																											
Superficie boscata	28,44																											
Quota media (m. s.l.m.)	350																											
Quota massima	520																											
Quota minima	75																											
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	30° - 20°	Esposizione	S																							
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																										
Patologia riscontrata	nessuna		% Sup. interessata	0%																								
Dati dendrometrici del ceduo (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa di riferimento</td> <td>220,0</td> <td>Coefficiente di adeguamento</td> <td>100</td> <td>Turno</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Massa/ha ceduo</td> <td>220,0</td> <td colspan="3"> Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>25</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>25</td> <td>Stramature</td> <td>25</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Massa totale ceduo</td> <td>6.257</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Massa di riferimento	220,0	Coefficiente di adeguamento	100	Turno	15	Massa/ha ceduo	220,0	Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>25</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>25</td> <td>Stramature</td> <td>25</td> </tr> </table>			Giovani	25	Medie	25	Mature	25	Stramature	25	Massa totale ceduo	6.257			
Massa di riferimento	220,0	Coefficiente di adeguamento	100	Turno	15																							
Massa/ha ceduo	220,0	Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>25</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>25</td> <td>Stramature</td> <td>25</td> </tr> </table>			Giovani	25	Medie	25	Mature	25	Stramature	25																
Giovani	25	Medie	25	Mature	25	Stramature	25																					
Massa totale ceduo	6.257																											
Descrizione particellare: Formazione ascrivibile all'orno-ostrieto tipico formata da un ceduo, a tratti rado, tipicamente di carpino nero, orniello e roverella. In associazione è spesso presente anche la rovere; frequenti sono i fenomeni di ibridazione tra le due querce. Si sottolinea anche la presenza di sporadici ciliegi e castagni. Strato arbustivo composto da nocciolo, viburno e sorbo. I suoli sono superficiali, talvolta pietrosi ad alto drenaggio ed accumulo di sostanza organica localizzato. La pendenza dei versanti è discreta soprattutto a ridosso degli impluvi. La forma di governo è ascrivibile ai cedui in parte tendenzialmente invecchiati, in parte di recente formazione e solo minimamente utilizzati, caratterizzati dalla presenza di ceppaie ben distribuite con un cospicuo numero di polloni. La rinnovazione gamica deve essere assolutamente favorita. La viabilità è scarsa ma nel complesso di buona accessibilità.																												

Formazione ascrivibile all'orno-ostrieto tipico formata da un ceduo, a tratti rado, tipicamente di carpino nero, orniello e roverella. In associazione è spesso presente anche la rovere; frequenti sono i fenomeni di ibridazione tra le due querce. Si sottolinea anche la presenza di sporadici ciliegi e castagni. Strato arbustivo composto da nocciolo, viburno e sorbo. I suoli sono superficiali, talvolta pietrosi ad alto drenaggio ed accumulo di sostanza organica localizzato. La pendenza dei versanti è discreta soprattutto a ridosso degli impluvi. La forma di governo è ascrivibile ai cedui in parte tendenzialmente invecchiati, in parte di recente formazione e solo minimamente utilizzati, caratterizzati dalla presenza di ceppaie ben distribuite con un cospicuo numero di polloni. La rinnovazione gamica deve essere assolutamente favorita. La viabilità è scarsa ma nel complesso di buona accessibilità.

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

206 mappali (82,01041 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - E

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Orno-ostrieti, ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo - attribuita a 206 mappali per una superficie (82,01041 ha)

- numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 15, obbligo di rilascio di almeno 80 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 11 m), possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero

Unità Conoscitiva n. 17

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Ceduo	Fascia vegetazionale	QTA - FA																									
Tipo forestale	Orno-ostrieto tipico																											
Superficie totale (ha)	156,95	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>43</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>22</td></tr> <tr><td>Quercus pubescens</td><td>20</td></tr> <tr><td>Juniperus communis</td><td>4</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>4</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>2</td></tr> <tr><td>Sorbo spp.</td><td>2</td></tr> <tr><td>Viburnum lantana</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cornus mas</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Ostrya carpinifolia	43	Fraxinus ornus	22	Quercus pubescens	20	Juniperus communis	4	Altre specie arboree	4	Altri arbusti	2	Sorbo spp.	2	Viburnum lantana	2	Cornus mas	1					
Specie	Presenza % della specie																											
Ostrya carpinifolia	43																											
Fraxinus ornus	22																											
Quercus pubescens	20																											
Juniperus communis	4																											
Altre specie arboree	4																											
Altri arbusti	2																											
Sorbo spp.	2																											
Viburnum lantana	2																											
Cornus mas	1																											
Superficie non boscata	0,00																											
Superficie improduttiva	0,00																											
Superficie boscata	156,95																											
Quota media (m. s.l.m.)	550																											
Quota massima	857																											
Quota minima	120																											
Assolazione (hn)	> 1800	Inclinazione (gradi)	30° - 20°	Esposizione	S																							
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																										
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																									
Dati dendrometrici del ceduo (massa espressa in mc) <table border="1"> <tr> <td>Massa di riferimento</td> <td>135,0</td> <td>Coefficiente di adeguamento</td> <td>100</td> <td>Turno</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Massa/ha ceduo</td> <td>135,0</td> <td colspan="3"> Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>40</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>20</td> <td>Stramature</td> <td>15</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Massa totale ceduo</td> <td>21.189</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Massa di riferimento	135,0	Coefficiente di adeguamento	100	Turno	20	Massa/ha ceduo	135,0	Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>40</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>20</td> <td>Stramature</td> <td>15</td> </tr> </table>			Giovani	40	Medie	25	Mature	20	Stramature	15	Massa totale ceduo	21.189			
Massa di riferimento	135,0	Coefficiente di adeguamento	100	Turno	20																							
Massa/ha ceduo	135,0	Ripartizione cronologica % dei polloni <table border="1"> <tr> <td>Giovani</td> <td>40</td> <td>Medie</td> <td>25</td> <td>Mature</td> <td>20</td> <td>Stramature</td> <td>15</td> </tr> </table>			Giovani	40	Medie	25	Mature	20	Stramature	15																
Giovani	40	Medie	25	Mature	20	Stramature	15																					
Massa totale ceduo	21.189																											

Descrizione particellare:

Formazione di orno-ostrieto, caratterizzata dalla ridotta copertura del soprassuolo esercitata dalle piante che si presentano allo stadio poco più che arbustivo dovuto principalmente alle difficili condizioni pedo-climatiche dei terreni nei quali si insediano; talvolta si possono osservare affioramenti rocciosi e pendenze assai elevate. Si incontra principalmente carpino nero associato a orniello, roverella e qualche altra sporadica specie. A livello di arbusti si trova una discreta quantità di ginepro, rovo, corniolo e viburno. La copertura è lacunosa. Viste le condizioni stazionali poco favorevoli e l'elevata assolazione dovuto all'esposizione ed alla pendenza del versante si allungano i turni del taglio portandolo a 20 anni e si aumentano le matricine da rilasciare. Questo anche per compensare la crescita dei polloni che risulta essere più lenta qui rispetto ad altre localizzazioni ove è sempre presente il carpino nero e le specie associate. Accessibilità non sempre facile.

Prescrizioni da applicare:

Super Categoria Normativa:

669 mappali (349,1544 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - E

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Altre formazioni di latifoglie governate a ceduo - attribuita a 669 mappali per una superficie (349,1544 ha)

- numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m)

Unità Conoscitiva n. 18

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA - FA
Tipo forestale	Ostrio-querceto tipico		
Superficie totale (ha)	0,72	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO	
Superficie non boscata	0,00	Specie	Presenza % della specie
Superficie improduttiva	0,00	Quercus pubescens	40
Superficie boscata	0,72	Quercus petraea	39
Quota media (m. s.l.m.)	730	Ostrya carpinifolia	8
Quota massima	781	Fraxinus ornus	7
Quota minima	105	Altre specie arboree	3
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Altri arbusti	2
		Juniperus communis	1
Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	S
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03		Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi	
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc)			
Massa/ha forma promiscua	140,0	Massa totale forma promiscua	101

Descrizione particellare:

Formazione a prevalenza di roverella e rovere, frequentemente ibridati tra loro. In associazione si osservano sporadici elementi dell'orno-ostrieto. Le querce sono per lo più di origine gamica, allo stadio evolutivo adulto- maturo. Alcuni esemplari mostrano segni di senescenza. Superficie regolarmente soggetta a pascolo equino. Suoli mediamente profondi. Buona rinnovazione, presente soprattutto allo stadio di plantula. Copertura lacunosa. Accessibilità buona.

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 7 mappali (2,8417 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- taglio per piede d'albero al fine di eliminare le piante deperienti e favorire la rinnovazione esistente

Super Categoria Normativa:

7 mappali (2,8417 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

Unità Conoscitiva n. 19

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Neoformazione	Fascia vegetazionale	QTA																
Tipo forestale	Corileto																		
Superficie totale (ha)	0,67	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corylus avellana</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Fraxinus ornus</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Populus alba</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Ostrya carpinifolia</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Robinia pseudoacacia</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Altre specie arboree</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Altri arbusti</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Corylus avellana	40	Fraxinus ornus	18	Populus alba	13	Ostrya carpinifolia	12	Robinia pseudoacacia	9	Altre specie arboree	5	Altri arbusti	3
Specie	Presenza % della specie																		
Corylus avellana	40																		
Fraxinus ornus	18																		
Populus alba	13																		
Ostrya carpinifolia	12																		
Robinia pseudoacacia	9																		
Altre specie arboree	5																		
Altri arbusti	3																		
Superficie non boscata	0,00																		
Superficie improduttiva	0,00																		
Superficie boscata	0,67																		
Quota media (m. s.l.m.)	465																		
Quota massima	480																		
Quota minima	450																		
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	S														
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																			
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																
Dati dendrometrici relativi alla neoformazione <table border="1"> <tr> <td>Tipo forestale potenziale</td> <td>Orno-ostrieto tipico</td> </tr> <tr> <td>Anni per ingresso in gestione</td> <td>10</td> </tr> </table>						Tipo forestale potenziale	Orno-ostrieto tipico	Anni per ingresso in gestione	10										
Tipo forestale potenziale	Orno-ostrieto tipico																		
Anni per ingresso in gestione	10																		
Descrizione particellare: Formazione di ricolonizzazione di un'area ex-prativa in cui il nocciolo, presente con densità elevate, si accompagna al carpino nero ed altre specie sporadiche come pioppo e robinia che occupano il piano dominante. Probabilmente popolamenti di transizione verso tipologie più stabili. Suoli mediamente profondi. Copertura regolare scarsa. Accessibilità buona.																			

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 14 mappali (7,199461 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- lasciare il bosco alla libera evoluzione, prevedendo interventi di pulizia a carico del nocciolo con rilascio di tutte le altre specie presenti.

Super Categoria Normativa:

14 mappali (7,199461 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - C

Prescrizioni speciali:

Unità Conoscitiva n. 20

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Forma promiscua	Fascia vegetazionale	QTA
Tipo forestale	Castagneto dei suoli xerici		
Superficie totale (ha)	0,71	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO	
Superficie non boscata	0,00	Specie	Presenza % della specie
Superficie improduttiva	0,00	Castanea sativa	30
Superficie boscata	0,71	Ostrya carpinifolia	30
Quota media (m. s.l.m.)	615	Fraxinus ornus	16
Quota massima	645	Corylus avellana	8
Quota minima	590	Quercus pubescens	5
		Altre specie arboree	3
		Acer campestre	2
		Altri arbusti	2
		Cornus mas	2
		Quercus petraea	1
		Viburnum lantana	1
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	30° - 20°
		Esposizione	S
Epoca di taglio del ceduo dal 01/10 al 15/03	Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi		
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%
Dati dendrometrici forma promiscua (massa espressa in mc)			
Massa/ha forma promiscua	150,0	Massa totale forma promiscua	107

Descrizione particellare:

Unità isolata ricompresa all'interno di ampie formazioni con carpino nero prevalente. Suoli superficiali, a tratti pietrosi ad esposizione calda. In questa porzione localizzata si è affermato il castagno in condizioni stazionali più favorevoli in particolare dal punto di vista edafico. Il castagno si trova sul piano dominante ma è in condizione fitosanitaria precaria. Il piano dominato è costituito da specie appartenenti all'orno-ostrieto e corileto. La viabilità è prossima.

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 11 mappali (13,05737 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva

- sulle eventuali piante di castagno da frutto, da conteggiare come matricine, sono consentiti interventi di potatura fitosanitaria e di ringiovanimento della chioma. E' consentito il taglio dei soggetti arborei situati entro una distanza pari a una volta e mezzo l'altezza delle piante di castagno da frutto.

Super Categoria Normativa:

11 mappali (13,05737 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - F

Prescrizioni speciali:

prescrizione relativa a - Orno-ostrieti, ostrio-querceti, querceti dei substrati magmatici e variante dei suoli xerici del rovereto governati a ceduo - attribuita a 11 mappali per una superficie (13,05737 ha)

- numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m) compresi tutti quelli con diametro a 1,3 m da terra maggiore di 35 cm fino all'età di 4 volte il turno minimo, possibilmente appartenenti alle seguenti specie: aceri, faggio, cerro, leccio, farnia e altre querce, sorbi ciliegi, alberi di giuda, cipressi

Unità Conoscitiva n. 21

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Neoformazione	Fascia vegetazionale	QTA - FA																		
Tipo forestale	Ostrio-querceto tipico																				
Superficie totale (ha)	15,91	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Quercus pubescens</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>25</td></tr> <tr><td>Ostrya carpinifolia</td><td>18</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>5</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>5</td></tr> <tr><td>Juniperus communis</td><td>4</td></tr> <tr><td>Sorbo spp.</td><td>4</td></tr> <tr><td>Corylus avellana</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Quercus pubescens	36	Fraxinus ornus	25	Ostrya carpinifolia	18	Altri arbusti	5	Altre specie arboree	5	Juniperus communis	4	Sorbo spp.	4	Corylus avellana	3
Specie	Presenza % della specie																				
Quercus pubescens	36																				
Fraxinus ornus	25																				
Ostrya carpinifolia	18																				
Altri arbusti	5																				
Altre specie arboree	5																				
Juniperus communis	4																				
Sorbo spp.	4																				
Corylus avellana	3																				
Superficie non boscata	0,00																				
Superficie improduttiva	0,00																				
Superficie boscata	15,91																				
Quota media (m. s.l.m.)	490																				
Quota massima	705																				
Quota minima	410																				
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°																		
		Esposizione	S																		
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																					
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																		
Dati dendrometrici relativi alla neoformazione <table border="1"> <tr> <td>Tipo forestale potenziale</td> <td>Ostrio-querceto tipico</td> </tr> <tr> <td>Anni per ingresso in gestione</td> <td>15</td> </tr> </table>				Tipo forestale potenziale	Ostrio-querceto tipico	Anni per ingresso in gestione	15														
Tipo forestale potenziale	Ostrio-querceto tipico																				
Anni per ingresso in gestione	15																				
Descrizione particellare: Formazione di ricolonizzazione su ex- prati nella quale si insediano specie allo stadio arbustivo di roverella, ginepro, carpino nero, orniello e nocciolo. Talvolta è presente la robinia, ma in quantità non eccessiva. Copertura lacunosa. Accessibilità buona.																					

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 94 mappali (88,39616 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
 - lasciare il bosco alla libera evoluzione, prevedendo interventi di pulizia a carico del nocciolo con rilascio di tutte le altre specie presenti.

Super Categoria Normativa:

94 mappali (88,39616 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - C

Prescrizioni speciali:

Unità Conoscitiva n. 22

Comune di Cordignano

Piano di Riordino: Comune di Cordignano

Governo	Neoformazione	Fascia vegetazionale	QTA																				
Tipo forestale	Robiniato misto																						
Superficie totale (ha)	7,91	COMPOSIZIONE ARBOREA DEL SOPRASSUOLO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Presenza % della specie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Corylus avellana</td><td>45</td></tr> <tr><td>Robinia pseudoacacia</td><td>15</td></tr> <tr><td>Populus alba</td><td>10</td></tr> <tr><td>Acer campestre</td><td>8</td></tr> <tr><td>Acer pseudoplatanus</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fraxinus ornus</td><td>5</td></tr> <tr><td>Altre specie arboree</td><td>5</td></tr> <tr><td>Altri arbusti</td><td>4</td></tr> <tr><td>Juniperus communis</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Specie	Presenza % della specie	Corylus avellana	45	Robinia pseudoacacia	15	Populus alba	10	Acer campestre	8	Acer pseudoplatanus	7	Fraxinus ornus	5	Altre specie arboree	5	Altri arbusti	4	Juniperus communis	1
Specie	Presenza % della specie																						
Corylus avellana	45																						
Robinia pseudoacacia	15																						
Populus alba	10																						
Acer campestre	8																						
Acer pseudoplatanus	7																						
Fraxinus ornus	5																						
Altre specie arboree	5																						
Altri arbusti	4																						
Juniperus communis	1																						
Superficie non boscata	0,00																						
Superficie improduttiva	0,00																						
Superficie boscata	7,91																						
Quota media (m. s.l.m.)	530																						
Quota massima	620																						
Quota minima	455																						
Assolazione (hn)	1400 - 1800	Inclinazione (gradi)	20° - 10°	Esposizione	S-O																		
Residui lavorazione: concentrare residui negli spazi liberi																							
Patologia riscontrata	nessuna	% Sup. interessata	0%																				
Dati dendrometrici relativi alla neoformazione <table border="1"> <tr> <td>Tipo forestale potenziale</td> <td>Orno-ostrieto tipico</td> </tr> <tr> <td>Anni per ingresso in gestione</td> <td>10</td> </tr> </table>						Tipo forestale potenziale	Orno-ostrieto tipico	Anni per ingresso in gestione	10														
Tipo forestale potenziale	Orno-ostrieto tipico																						
Anni per ingresso in gestione	10																						
Descrizione particellare: Formazione di ricolonizzazione di un'area ex-prativa in cui il nocciolo, presente con densità elevate, si accompagna al carpino nero ed altre specie sporadiche come pioppo e robinia che occupano il piano dominante. Probabilmente popolamenti di transizione verso tipologie più stabili. Suoli mediamente profondi. Copertura uniforme nel piano dominato, mentre il dominante è interessato da una copertura lacunosa. Accessibilità buona.																							

Prescrizioni da applicare:

Prescrizioni per Unità Conoscitiva: 66 mappali (44,88813 ha) attribuiti all'Unità Conoscitiva
 - lasciare il bosco alla libera evoluzione, prevedendo interventi di pulizia a carico del nocciolo con rilascio di tutte le altre specie presenti.

Super Categoria Normativa:

66 mappali (44,88813 ha) attribuiti alla Super Categoria Normativa - C

Prescrizioni speciali: